

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2021

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação
ametotradina (pirimidilamina)	ENERVIN SC (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural;	Não	35	Superfície/Preventivo
ametotradina+metirame (pirimidilamina+ ditiocarbamato)	ENERVIN (BASF)				Superfície/Penetrante/ Preventivo / curativo fase inicial/ anti- esporulante
ametotradina+dimetomorfe (pirimidilamina-morfolina)	ORVEGO (BASF)				
amissulbrome (sulfonamida)	LEIMAY (NISSAN CHEMICAL)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Penetrante /Preventivo
amissulbrome + folpete (sulfonamida+ftalamina)	SANVINO (ADAMA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		28	Penetrante /superfície/Preventivo
amissulbrome + mancozebe (sulfonamida+ditiocarbamato)	MOONLIGHT (UPL)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural			
azoxistrobina (estrobilurina)	AZAKA (CHEMINOVA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural; ação simultânea anti-oidio;		21	Penetrante com mobilidade Translaminar e lateral/ atividade essencialmente Preventiva e anti-esporulante, algum ação curativa
	AZBANY PRO- (NUFARM PORTUGAL)				
	QUADRI (SYNGENTA)				
	IRIBIS (FMC)				
	SINSTAR (AGROLAC)				
azoxistrobina + folpete (estrobilurina+N tiotrihalometilo)	QUADRI MAX (SYNGENTA) v	Não aplicar em uvas de mesa ,com exceção de ** Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural		28*	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	TAGUS F (SELECTIS)				
	TRUNFO F (SAPEC)				
benalaxil-M + folpete (fenilamida + N tiotrihalometilo)	FANTIC F (ISAGRO_SPA)	Não aplicar em uvas de mesa ,com exceção de ** Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural		42	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	SAVIRAN STAR (ISAGRO_SPA)				
	SIDECAR F (ISAGRO_SPA)				
	STADIO F (ISAGRO_SPA)				
benalaxil-M + mancozebe (fenilamida+ditiocarbamato)	FANTIC M (ISAGRO_SPA)	Não aplicar em uvas de mesa ,com exceção de ** Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural		56*/42*	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	SAVIRAM MZ (ISAGRO)				
	STADIO M (NUFARM PORUGAL)				
bentiavalicarbe+cobre (amida+inorgânico)	SOLLICIT (UPL)	Em videiras de uva de mesa, aplicações apenas até à floração. Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural)		28	Penetrante com mobilidade translaminar/superfície / Preventivo/ Curativo
	VINTAGE DISPERSS (UPL IBERICA e GENIEN))				
ciazofamida (ciano-imidazol)	MILDICUT (LUSOSE)	Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural)		21	Penetrante com mobilidade translaminar/superfície / Preventivo
	BRIONFLO 100 SC (EUROTSA)				
	NANAMID 100 SC (MANICA)				
	DARAMUN (DIACHEM)				
	KENKIO (BELCHIM)				
cioxanil+cobre (oxicloreto) (acetamida + inorgânico)	CIMOFARM C (SAPEC)	Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de cu		28	Penetrante/superfície/ Preventivo e curativo
	VITIEPC C (SAPEC)				
	CIMONIL C (SELECTIS)				
	CURAME 25 WG (MANICA)				
cioxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio) (acetamida + inorgânico)	INACOP PLUS BLU (IND. VALLES)	Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de cu	21	Penetrante/superfície/ Preventivo e curativo	
	CUPERTINE SUPER (IND. VALLES)				
cioxanil+famoxadona (acetamida +oxazoladinadiona)	EQUATION PRO (DUPONT)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	28	Penetrante/superfície/ Preventivo e curativo	
	MILGOLD PRO (DUPONT)				
cioxanil+folpete (acetamida+azol +N- tiotrihalometilo)	TWINGO (SANGOSSE)	Realizar no máximo 1 tratamento. Em vinhas para produção de uvas de mesa, terá que ser posicionado antes da floração	28*/70*	Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo	
	MILITE (SELECTIS)	Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto. Apenas em uvas para vinificação			
	MILITE AZUL (SELECTIS)				
	VITIEPC AZUL (ASCENZA)				
	VITIEPC (ASCENZA)				
VITIEPC WG ADVANCE (ASCENZA)					
cioxanil+folpete+ fosetil- alumínio (acetamida+ftalimida +organometálico)	MAGMA TRIPLE WG (AFRASA)	Aplicar apenas com trator cabinado fechado	28	Penetrante/Sistêmico/ Preventivo e curativo	
cioxanil+folpete+ mancozebe (acetamida+N-tiotrihalometilo +ditiocarbamato)	MILTRIPLO (SELECTIS)		56*	Penetrante/Superfície Preventivo e curativo	
cioxanil+folpete+ metalaxil (acetamida+ftalimida+fenilamida)	EKYP TRIO (ASCENZA)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano	42*/28*	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo	
	ACTLET EVO (ASCENZA)				
cioxanil+folpete+ metalaxil-M (acetamida+ ftalimida+fenilamida)	BOLTEX EVO (SELECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano, em uva de mesa apenas pode ser aplicado até á floração	28*	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO I)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação	
cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida + ftalimida + trazol)	VITIPEC COMBI AZUL (ASCENZA)	Ação simultânea anti-oidio	Não	42	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo	
cimoxanil+fosetil-alumínio+cobre (oxicloreto) (acetamida+fosfanato+inorgânico)	VITENE TRIPLO R (SPICAM PORTUGAL)	Para evitar resistências, não efetuar mais de 4 aplicações/ ciclo cultural		40	Penetrante com ação translaminar/ sistêmico/Preventivo e curativo	
cimoxanil+ mancozebe (acetamida + ditiocarbamato)	CIMAZUL (SELECTIS)			56*/28*	Penetrante com ação translaminar/ Superfície/Preventivo e curativo	
	CIMOFARM M WG (INDOFIL)			Para evitar resistências, não efetuar mais de 2 aplicações/ ano com este produto. E 4 aplicações com outros produtos contendo cimoxanil		28
	CIMORAME M WP (INDOFIL)					56*/28*
	MOXIMATE 505 WG (NUFARM)					30*
	MOXIMATE 505 WP(INDOFIL)					56*/28
	MICENE AZUL (SIP. INAGRA)					30
	MICENE PLUS (SIP. INAGRA)					
	PROFILUX (BELCHIM)					
	VIRONEX MZ (IQV VALAGRO)					
	CYMOZEB WG (BCP)	28				
EBRIMAX WG (BELCHIM)						
cimoxanil+ metirame (acetamida + ditiocarbamato)	AVISOS DF (BASF)	Para evitar resistências , não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural	35	Penetrante com ação translaminar/ superfície/Preventivo e curativo		
Cimoxanil +zoxamida (acetamida +benzamida)	MILRAZ PRO (SIPCAM)		28			
cobre (oxicloreto) (inorgânico) (Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos do ano)	NEORAM MICRO (ISAGRO_SPA)	No conjunto dos tratamentos com produtos contendo cobre, não exceder a dosagem de 4 Kg de Cu/ha/ano Aplicação nos últimos 2 tratamentos, favorece o atempamento das varas	SIM	7	Fungicida de superfície/ Preventivo	
	BLAURAME (IND_VALLÉS)					
	CUPRITAL (SAPEC)					
	CUPRAVIT (BAYER)					
	COBRE 50 SELECTIS (SELECTIS)					
	CURENOX 50 (IND_VALLÉS)					
	ULTRA COBRE (IND_VALLÉS)					
	EXTRA-COBRE 50 (IND_VALLÉS)					
	INACOP-L (INAGRA)					
	COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO_SPA)					
	FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO_SPA)					
	HIDROTEC 50 WP (SELECTIS)					
	CUPROCAFFARO WG (ISAGRO)					
	CUPROCOL (SYNGENTA)					
	FLOWBRIX (MONTANWERKE)					
	FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE)					
	CUPRITAL SC (AMBECEM)					
	COZI 50 (VALLÉS)					
	OXITEC 25% HI BIO (AMBECEM)					
	NUCOP M 35% HI BIO (AMBECEM)					
	CUPROXI FLO (ADAMA)					
	COPPER KEY FLOW(KEY)					
	COBRE LAINCO					
	CUPRA (LAINCO)					
	CODIMUR 50 (SARABIA)					
	CODIMUR SC (SARABIA)					
COPPER KEY (KEY)						
CUPROZIM 35 (SPIESS)						
OXICUPER (SELECTIS)						
TRAXI 70 FLOW (BRANDT)						
MARIMBA 35 WG (BELCHIM)						
cobre (oxicloreto +sulfato de cobre)+benaxil-M (inorgânico fnilamida)	FANTIC A (ISAGRO)	Utilizar este produto após o aparecimento dos cachos	NÃO	21*/40*	Superfície/sistêmico/ Preventivo e curativo	
cobre (oxicloreto de cobre)+dimetomorfe (inorgânico+morfolina)	FORUM C (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		21	Superfície/penetrante/ Preventivo e anti-esporulante	
	SENADOR C (SELECTIS)			28		
	SPYRIT C (SAPEC)			28		
cobre(oxicloreto de cobre)+iprovalicarbe (inorgânico+carbamato)	MELODY COBRE (BAYER)	Usar só após a floração; Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	NÃO	21	Superfície/penetrante/ Preventivo e curativo anti-esporulante	
cobre(oxicloreto de cobre)+mandipropamida (inorgânico+mandelamida)	AMPECIO C (SYNGENTA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO II)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação		
cobre(oxicloreto de cobre)+mancozebe (inorgânico+ditiocarbamato)	CODIMUR M (SARABIA)		NÃO	21	Superfície/preventivo		
	DOUBLE COPPER KEY						
	LAINCOBRE M (LAINCO)						
	AFROSAN DUPLO (AFRASA)						
cobre (óxido cuproso) (inorgânico)	COBRE NORDOX 45 WG (MASSÓ)	Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos. Não aplicar na floração, com tempo frio e chuvoso.		21			
	COBRE NORDOX 75 WG (MASSÓ)						
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico)	KADOS (DUPONT)	Nunca aplicar durante a floração, se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Pode ter ação sobre geadas fracas, se aplicado antecipadamente. Não aplicar quando as condições são favoráveis à ocorrência de geadas fortes Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano	SIM	7	Superfície/ Preventivo		
	KOCIDE 2000 (DUPONT)						
	KOCIDE 35 DF (DUPONT)						
	KOCIDE OPTI (DUPONT)						
	CHAMPION WP (NUFARM_P)						
	CHAMPION FLOW (NUFARM_P)						
	COPERNICO 25% HIBIO (AMBECEM)						
	HIDROTEC 20% HIBIO (AMBECEM)						
	HIDROTEC 50% WP (SELECTIS)						
	CHAMP DP (NUFARM_P)						
	COPPER HYDROXIDE SELECTIS 20						
	COBRE NORDOX 45 WG (CQ MASSÓ)						
MAXI COPPER WG (ASCENZA)							
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) (inorgânico)	CLARUS SC	Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/anos no conjunto dos produtos com cobre		21			
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)						
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + valifenalato (inorgânico+ valinamida carbamatos	VALIS PLUS (BIOCHIM)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	NÃO	28	Superfície/ Sistêmico translaminar e de difusão/Preventivo/ curativo/anti-esporulante		
cobre (hidróxido)+dimetomorfe (inorgânico + morfolina)	SPHINX PLUS (ADAMA)	Não fazer mais de 3 a 4 aplicações por ciclo cultural			NÃO	28	Penetrante/Preventivo /curativo/anti-esporulante
	SPYRIT COPPER (ASCENZA)						
SENADOR HC (SELECTIS)							
cobre (hidróxido)+metalaxil (inorgânico + fenilamida)	CYCLO R-líquido (EPAGRO)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		56	Sistêmico/Preventivo e curativo e anti-esporulante		
cobre (oxicloreto de cobre)+metalaxil-M	RIDOMIL GOLD R WG (SYNGENTA)			20			
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	NOVICURE (UPL)	Realizar no máximo 5 aplicações no mesmo solo agrícola, com este produto não excedendo 4 Kg de cobre/ha/ano no conjunto dos produtos que contenham cobre	SIM	21	Superfície/ Preventivo		
	CUPROXAT (NUFARM_P)	Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso					7
cobre (sulfato de cobre tribásico)+fosetil (sal alumínio) (inorgânico + organofosfonato)	OPTIX R (UPL)	Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso	NÃO	28	Superfície/Sistêmico/P reventivo		
cobre (sulfato de cobre tribásico)+zoxamida (inorgânico + benzamida)	AMALINE FLOW (NUFARM_P)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano. Não aplicar durante a floração			28	Superfície e penetrante/ Preventivo	
cobre (sulfato de cobre e cálcio) + mancozebe (inorgânico + ditiocarbamato)	CUPERTINE M (IND. VALLÉS)	Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso			56*/56*	Superfície/Preventivo	
cobre (sulfato cobre e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	BORDEAUX MISTURE 124 SC	Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso	SIM	21	Superfície/ Preventivo		
	MANIFLOW (MANICA))						
	CALDA BORDALESA QUIMIGAL (VALLÉS						
	CALDA BORDALESA RSR (CEREXAGRI)						
	CALDA BORDALESA QUIMAGRO						
	CALDA BORDALESA SELECTIS						
	BORDALESA SELECTIS 124 SC						
	CALDA BORDALESA CAFFARO 20						
CALDA BORDALESA VÁLLES							
cobre (sulfato e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	CALDA BORDALESA SAPEC	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	SIM	7	Superfície/ Preventivo		
	MANIFLOW (MANICA)						
cobre (sulfato cobree cálcio mistura bordalesa)+cimoxanil (inorgânico+acetamida)	INACOP PLUS BLUE (VALLÉS	Não fazer mais de 4 aplicações em cada ano	NÃO	21	Superfície/penetrante/ preventivo e curativo		
	CURAME POLTIGLIA					20	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO III)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação
Cos-oga (fosfanato)	(FYTOSAVE (FYTOFEND)	Não fazer mais de 8aplicações em cada ano	SIM	3	Preventivo/ativador das defesas naturais das plantas
Ditianão +fosfanato de potássio (quinona + fosfanato)	ENVITA (BASF)	Não fazer mais de 4 aplicações/ ano, apenas em uvas para vinificação	NÃO	42*	Superfície/Sistémico/ Preventivo/Estimula a defesa natural das plantas
dimetomorfe (morfolina)	SPHINX (ADAMA)	Dependendo do produto, não efetuar mais de 3 a 4 aplicações/ano Alguns dos produtos contendo folpete não podem ser aplicados em uva de mesa, ou apenas até à floração*** (consultar rótulo)		10	Penetrante/Preventivo/ anti-esporulante
dimetomorfe+ditianão (morfolina+quinona)	FORUM GOLD (BASF)			35	
dimetomorfe + folpete (morfolina+N-tiotrihalometilo)	DIFOMIL WG (SHARDA)			40*	
	FORUM F (BASF)			42*	
	BACO WG (NUFARM PORTUGAL)			40*	
	METOMOR F (SHARDA COPROCHEM)			40*	
	SENADOR F (SELECTIS)			42*	
	SPYRIT F(ASCENZA)			42*/***	
dimetomorfe + mancozebe (morfolina+ditiocarbamato)	VINOSTAR (ADAMA)			42*	
	BELVITIS (SELECTIS) 28			28	
	FILDER 69 WG (UPL IBERIA)				
	ACROBAT M DG (BASF)				
	CYNDA (ARYSTA)				
PARAAT (BASF)					
dimetomorfe+metirame morfolina+alquilenobis(ditiocarbamato)	SENADOR MZ (SELECTIS)		66*/28*		
	SPYRIT M (ASCENZA)	35			
dimetomorfe +piraclostrobina (morfolina +estrobilurina)	CABRIO TEAM (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações no conjunto das doenças a tratar / ano. Combate simultaneamente o oídio, apenas para uva de mesa	35**	Penetrante com mobilidade translaminar/Preventivo/ Curativo/ anti-esporulante	
dimetomorfe+zoxamida (morfolina + benzamida)	PRESIDIUM (GOWANL)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	NÃO	28	Penetrante/Preventivo / anti-esporulante
fluopicolida+ foseetil-alumínio (benzamida + organometálico)	PROFILER (BAYER)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano			Penetrante c/movimento translaminar/ Sistémico/Preventivo com ligeira ação curativa e anti-esporulante
folpete (ftalimida)	FLEXI 80 WG (SHARDA)	Alguns fungicidas com a s. ativa folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração*** (Consultar rótulo do produto)		28*	Superfície/Preventivo
	FOLLOW 80 (SHARDA/NUFARMA)		28*		
	FOLPETIS SC (SELECTIS)		28*		
	FOLPAN 80 WDG (ADAMA)		42		
	FOL-HITEC(SHARDA)		28*		
	FOLPEC 50 (SAPEC)		42*		
	FOLPEC 50 SC (ASCENZA)		28*		
	FOLPEC 50 AZUL (SAPEC)		34*		
	FOLLET 80 WG (SHARDA)		28*		
	FLOVINE (ADAMA)		42*/56**		
	EMENDO F (BELCHIM)		42*		
	JAVA F (BELCHIM)		28*/***		
	SOLOFOL (BELCHIM)				
	folpete+foseetil (sal alumínio) (ftalimida + organofosfonato)		RHODAX FLASH (BAYER)	Alguns fungicidas que contêm folpete não devem ser utilizados em	
MAESTRO F (SAPEC)					
MAESTRO F AZUL (HELM AG)					
MAESTRO F WG ADVANCE (ASCENZA)					
ZETYL COMBI AZUL (HELM AG)					
ZETIL COMBI (SELECTIS)					
folpete+foseetil-alumínio+ iprovalicarbe (ftalimida+organometálico+amida)	MELODY SUPER (BAYER)		42*	Superfície/Sistémico/ Preventivo/ Curativo	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA Videira em 2020 (CONTINUAÇÃO IV)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação
folpete+ iprovalicarbe (ftalimida+carbamato)	MELODY (BAYER)	vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural (Consultar rótulo do produto)	NÃO		Superfície/sistémico/p reventivo e curativo
Folpete+ mancozebe +cimoxanil (ftalamida +ditiocarbamato+acetamida)	MILTRIPLO (SELECTIS)			56*	Superfície/penetrante/ prevenivo/curativo
folpete+mandipropamida (ftalimida + mandelamida)	MANDATÓRIO F (SYNGENTA)			28*	Superfície/penetrante /prevenivo/ Curativo e anti-esporulante
	PERGADO F (SYNGENTA)	28*			
folpete+metalaxil (ftalimida + fenilamida)	EKYP COMBI (ASCENZA)	Alguns fungicidas que contenham folpete em produção de uvas de mesa; apenas podem ser aplicados até à floração Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		42*/28*	Sistémico/ Preventivo/ Curativo
	EKYP COMBI AZUL (ASCENZA)			28*/56*	
	ARMETIL 50 (VALLÉS)				
	MEVAXIL COMBI (VALLÉS)				
folpete+metalaxil-M (ftalimida + fenilamida)	FOLPAXIL AZUL (SELECTIS)	28*/42*			
	CYCLO M PLUS (AFRASA)	Em uva de mesa, aplicações apenas até à floração**, não efetuar mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28*/**	Superfície /Sistémico/ Preventivo/ Curativo
			BOLTEX F (SELECTIS)	28	
			ACTLET F (ASCENZA)	28	
			MILDOR COMBI F (AGCHEML)	42*	
			FANTATIC F (ISAGRO)		
			FOLPAN GOLD (ADAMA)		
SAVIRAN STAR (ISAGRO)					
RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (SYNGENTA)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Alguns fungicidas que contenham folpete não podem ser aplicados em vinhas para produção de uvas de mesa , ou apenas até à floração(Ver rótulo)				
folpete+ oxatiapiprolina (ftalimida + piperidinil-tiazol-oxatia)	ZORVEC™ VINABRIA™ (DUPONT)	Não fazer mais de 2 aplicações	56	Superfície/movimento sistémico, translaminar e ascendente via xilema / Preventivo/ Curativo	
folpete+ piraclostrobina (ftalimida + estrobilurina)	CABRIO STAR (BASF)	Não fazer mais de 2 aplicações consecutivas e 3 aplicações no total	42*	Superfície/Penetrante translaminar/Prevenivo/ curativo	
folpete+valifenalato (ftalimida + amidas ac)	VALIS F (BELCHIM)	Não fazer mais de 3 aplicações, apenas em uvas para vinificação	42*	Superfície/Sistémico com sistemias ascendente /Prevenivo/ curativo	
	JAVA F (BELCHIM)				
	EMENDO F (BELCHIM)				
fosetil (sal de alumínio) (organometálico)	FOSAL 80 WG (CHEMINOVA)	Não fazer mais de 2 a 4 aplicações por ciclo cultural dependendo do produto, consultar rótulo	28	Sistémico (ativa defesas naturais das plantas)/Prevenivo	
	KITAN DUPLO (GENYENM)				
	KEYFOL WG (KEY)				
	KEYFOL WP (KEY)				
	KILATE WG (LAINKO)				
	KILATE (LAINKO)				
	GOLBEX WG (SARABIA)				
	GOLBEX WP (SARABIA)				
	FOSPROBEL 80 WG (PROBELTE)				
	ALIAL 80 WG (FMC)				
GOLBEX WG (SARABIA)					
OPTIX DISPERS (UPL)	Não fazer mais de 6 aplicações por ano.	28*			
fosetil-alumínio+ mancozebe (organofosfonado+ditiocarbamato)	MAESTRO M WG ADVANCE (SAPEC)	Não fazer mais de 2 a 3 aplicações por ano (consultar o rótulo)	28	Sistémico (ativa defesas naturais das plantas)/ Superfície /Prevenivo	
	ZETYL MZ WG (SELECTIS)				
	MILAGRO (SPICAM)				
	KATANGA DUPLO (GENYEN)				
	FILAL DUPLO (AFRASA)				
	KITAN DUPLO (GENYEN)				
ALFIL DUPLO (AFRASA)					
fosfanatos de dissódio (fosfanato)	CERAXEL (BELCHIM)		21		
fosfanatos de potássio (fosfanato)	ALEXIN 75 LS (LUX)	Não efetuar mais de 3 a 5 aplicações /ciclo cultural (Dependendo do produto usado, consultar rótulo). Dose máxima /ha é de 4L	15	Sistémico/ preventivo/Estimula a defesa natural das plantas	
	PHYTO SARCAN (EXSA)				
	SAVIAL FORTE (LAINKO)				
	CURANE EVO (SIPCAM)				
	FOSKIA (BIOVERT)				
	SORIAL (LUX)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO V)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação
Fluopicolida (benzamida) foseetil (sal de alumínio) (organometálico)	PROFILER (BAYER)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Penetrante translaminar /sistémico / estimula as defesas naturais das plantas. Preventivo, curativo e anti-esporulante.
Fluaziname (dinitroanilina)	TIZCA (FMC)	Aplicar o produto sempre em mistura com fungicidas anti-míldio sistémicos ou penetrantes. Não efetuar mais de uma aplicação por ciclo cultural para o conjunto das doenças a tratar.		28*	Superfície /Preventivo
mancozebe (ditiocarbamato)	DITHANE NEOTEC (LUSOSEM)	Não fazer mais de 4 aplicações por ciclo cultural, com estes ou outros produtos contendo ditiocarbamatos (De acordo com o ofício/ circular nº 25/2020 da DGAV, os produtos que contenham a substancia ativa mancozebe, ou mistura de mancozebe com outras substancias ativas, apenas poderão ser utilizados na presente campanha)	8	28	Superfície / Preventivo
	MANFIL 75 WG (INDOFIL)				
	MANZENE WG (AGROTOTAL)				
	STEP 75 WG (SAPEC)				
	STEP WG (ASCENZA)				
	MANCOZAN (BAYER)				
	MANCOZEBE SAPEC (SAPEC)				
	MANCOZEBE SELECTIS (SELECTIS)				
	MANCOZEBE ASCENZA (ASCENZA)				
	MANZENE WG (AGCHEM)				
	MILTANE MICRO WG (SELECTIS)				
	MILTANE MICRO (SELECTIS)				
	FUNGITANE WP (SIPCAM_P)				
	MANZATE (UPL)				
	MANZATE WG (UPL)				
	VONDOZEB GD (UPL IBERIA)				
	FUNGITANE AZUL WP (SIPCAM_P)				
	FUNGITAN WP (SIPCAM)				
	DITHANE M-45 (ILUSOSEML)				
	VONDOZEB-D 80 PM (UPL IBERIAS)				
	CAIMAN WP (EPAGRO)				
	MANFIL 80 WP (INDOFIL)				
	MANFIL 75 WG (INDOFIL)				
UNIZEB (GENYENI)					
MANCOZEBE 80 VALLÉS					
MANGAZEB (LAINCO)					
MAESTRO M (SAPEC)					
SABERO MANCOZEBE 80 (SABERO)					
AVTAR 75 NT (INDOFIL)					
TRIMANOC DG (UPL)					
mancozebe + fosestill (ditiocarbamato + fosfanatoa)	AFIL DUPLO WG (AFRASA)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		28	Superfície/sistémico/ Preventivo
mancozebe + metalaxil (ditiocarbamato + fenilamida)	CRUZADO MZ (SELLECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Combate simultaneamente Black Rot		56*/28* *	Superfície/Sistémico /Preventivo / Curativo
	ARMETIL M (IQV AGRO PT)				
	SABRE M (JOVAGRO)S)				
mancozebe + metalaxil-M (ditiocarbamato + fenilamida)	RIDOMIL GOLD MZ PÉPITE (SYNGENTA)				
	MILDOR GOLD MZ (AGROTOTAL)				
mancozebe+ zoxamida +metenamida (ditiocarbamato+ benzamida)	LIETO (SIPCAM)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		28	Superfície/Penetrante/ Preventivo
	ADERIO (GOWAN)				
mandipropamida+ zoxamida (mandelamida+benzamida)	AMPEXIO (SYNGENTA)			21	Penetrante translaminar/Preventivo/ Curativo / anti-esporulante
metirame (ditiocarbamato)	POLYRAM DF (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		28	Superf./Preventivo
metirame+ piraclostrobina (ditiocarbamato+ metoxi-carbamato)	CABRIO TOP (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural Ação simultânea anti-oidio, Escoriose e Black rot		56	Superf./Translaminar/ Preventivo/ Curativo
Oxatiapiprolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline)	ORONDIS (DUPONT)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		14	Movimento sistémico Translaminar e ascendente via xilema / Preventivo/ Curativo
	ZORVEC ™ ZELAVIM ™ (DUPONT)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONCLUSÃO)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S. (dias)	Modo de ação	
Oxatiapiprolina +zoxamida (piperidiny-thiazole- isoxazoline +benzamida)	ZORVEC™ VINABLE™ (DUPONT)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano	NÃO	28	Movimento sistémico Translaminar e ascendente via xilema /Penetrante/ Preventivo/ Curativo	
piraclostrobina (estrobilurina)	CABRIO (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		35	Penetrante Translaminar/ Preventivo /Curativo	
óleo de laranja	PREV-AM (OROAGRI)	Não fazer mais de 6 aplicações por ciclo cultural Previne simultaneamente o Oídio	SIM	1	Preventivo/Contato	
	LIMOCIDE J (VIVAGRO)					
cerevisana	ROMEO (AGRO-LEVURES)	Realizar no máximo 10 tratamentos por ano. Trata simultaneamente o oídio e a podridão cinzenta				Indutor da resistência das plantas. . Preventivo
	ACTILEAF					
zoxamida (benzamida)	ZOXIUM 240 SC ()	Não fazer mais de 5 aplicações por ciclo cultural, até 3 consecutivos		NÃO	28	Penetrante/ Preventivo

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: SIFITO.DGAV.PT (consultada em 11/01/2021)

NOTAS: MPB. – Modo de Produção Biológico; I.S. – Intervalo de segurança (Uva vinificação*/Uva de mesa**, Aplicado apenas até á floração em Uvas de mesa***

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo e/ou Ficha Técnica dos produtos.